

No.	薬の名前・色／形・記号	用法				薬のはたらき	注意事項・相互作用・副作用など
		朝	昼	夕	寝前		
# 1	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 薄帯赤黄～くすんだ帯赤黄／錠剤 EPR 2.5: EPR2.5:2.5mg			1		血液中のコレステロールを減らす薬です。	筋肉痛、手足のしびれ、脱力感、赤褐色尿等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。 湿気を避けて保存してください。
		錠 分1 夕食後服用 40日分 (1日量1錠)					
# 2	アムロジピン錠 5mg「オーハラ」 白／錠剤 5:5 :5mg	1		1		血圧を下げる薬です。 狭心症の発作を予防する薬です。	服用期間中、グレープフルーツジュースは避けてください。 めまい等が起こることがあるので、車の運転等危険を伴う作業には注意してください。 体がだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐、皮膚のかゆみ、白目や皮膚が黄色くなる等の症状が現れた時は、すぐにお知らせください。
		錠 分2 朝・夕食後服用 40日分 (1日量2錠)					
3	アレロックOD錠 5 5mg ごく薄い黄色／錠剤 KH023	1		1		抗アレルギー薬です。 アレルギー性鼻炎の薬です。 じんましん、湿疹、皮膚炎の薬です。 かゆみを抑える薬です。	眠気を催すことがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等は控えてください。 水または白湯で飲むか、またはだ液で飲み込んでください。 室温で保管してください。
		錠 分2 朝・夕食後服用 40日分 (1日量2錠)					
# 4	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 黄褐色／顆粒剤 62	2.5	2.5	2.5		腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな人に用い、高血圧に伴う動悸・肩こり・のぼせ、肥満症、むくみなどの症状を改善します。	他の漢方薬を併用する場合は、その旨を主治医または薬剤師にお伝えください。 光の当たらない所に保管してください。
		g 分3 毎食前服用 28日分 (1日量7.5g)					

*備考

他の医療機関にかかる時は、この表を提示してください

保険医師名 中垣 嘉信

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください

くすりの詳しい情報は、以下のホームページでご覧になれます。

<http://www.pmda.go.jp/pnavi-01.html>

医療機関 長野県松本市笹部1-3-2

中垣内科医院

TEL 0263-28-1751